



پینک

درمان ضد پیری-پینک

درمان ضد پیری-پینک

روشن کننده • ضد لک • ضد پیری • پر کننده منافذ پوست و مسدود کننده منافذ

روش درمانی ضد پیری پینک یک راه حل پوستی حرفه ای که با بهبود متابولیسم پوست؛ از طریق فعالسازی داینامیک 56 جزء تشکیل دهنده آن، احیای سلولهای فیبروبلاست که چارچوب ساختار اصلی بافت ها هستند را تحریک می کند



پینک

روش درمانی ضد پیری - پینک یک محلول پوستی متشکل از 56 جز است که به بهبود سلولهای حیاتی فیرو بلاست ، که چارچوب ساختار اصلی بافت ها هستند ، کمک می کند




خصوصیات ویژه پینک

رنگ پوست

- ▶ حاوی گلوکوتائون است که باعث روشن شدن پوست و از بین بردن رادیکال های آزاد می شود
- ▶ حاوی 3 نوع آنزیم است که به سنتز گلوکوتائون در پوست کمک می کند


▶ حاوی 10 نوع ویتامین B کمپلکس (ویتامین B12) است که متابولیسم پوست را بهبود می بخشد



جوان سازی پوست

- ▶ حاوی فاکتورهای رشد، گیرنده های آدنوزین A2، می باشد که به بهبود سریع چرخه بازسازی پوست کمک می کند
- ▶ حاوی 6 نوع پپتید (EGF، FGF، IGF، TGF- β)، کوپر تری پپتید است که به احیای سلول های فیبروبلاست کمک می کند، که ساختار اصلی بافت را تشکیل می دهد
- ▶ حاوی کمپلکس نوروپپتیدی است، که یک فاکتور رشد محسوب میشود که به احیای سلولهای فیبروبلاست و رشد رگهای خونی کمک می کند، که برای روند بهبود زخم ضروری است


الرات ترمیم زخم نوروکس



مرطوب کردن پوست

- ▶ حاوی کمپلکس اسید آمینه است که محتوای NMF (عامل مرطوب کننده طبیعی) را افزایش می دهد
- ▶ حاوی 1.4 میلیون دالتون مولکول HA است که می تواند باعث برطرف شدن خشکی پوست شود


تغییر رطوبت پوست با گذشت زمان



فرآیندی که در آن کوآنزیم Q10 بر سیستم انتقال الکترون تأثیر می گذارد

فعال سازی انرژی پوست

- ▶ حاوی ویتامین B و اسید آمینه برای سنتز کوآنزیم است
- ▶ حاوی یو بی کینون (کوآنزیم Q10) است که اتصال برای تولید ATP است



1. Masahiro Shiragaki, AL. ZOOLOGICAL SCIENCE 17:661-666(2000) 2. Biochem. J. (2006) 400: 225-234 3. Mak, K.K. and Chan, S.Y. (2003) Epidermal growth factor as a biologic switch in hair growth cycle. The journal of biological chemistry, 278(28):26120-26126. 4. Alexandrescu, D. T., Kauffman, C. L., and Dasanu, C. A. (2009) The cutaneous epidermal growth factor network: Can it be translated clinically to stimulate hair growth? Dermatology online journal, 15 (3) 5. McElwee K.J., and Sinclair R. (2008) Hair physiology and its disorders. Drug discovery today: disease mechanisms, 5(2):163-171. 6. American Journal of Physiology: Renal Physiology (2007) 293: F1007-F1017 7. Imamura, T. (2014) Physiological functions and underlying mechanisms of fibroblast growth factor (FGF) family members: recent findings and implications for their pharmacological application. Biological and pharmaceutical bulletin, 37(7):1081-1089. 8. Stefan Becker, et al., Surgical Research 139:217-221(2007) 9. The Journal of Biological Chemistry (2001) 276(21): 18185-18192 10. The New England Journal of Medicine (1999) 341(10): 738-746 11. Simeon A. et al. Invest Dermatol, 115(6):962-8(2000) 12. Maquart FX, et al, FEBS Lett 238(2):343-6(1998) 13. Miriam A. et al, European Journal of Cell Biology 81: 153-160(2002) 14. Margadant, C. and Sonnenberg, A. (2010) Integrin-TGF- β crosstalk in fibrosis, cancer and wound healing. EMBO Reports, 11(2):97-105. 15. Clinical Cosmetic and Investigational Dermatology 2014;7:267-274 16. Biochim Biophys Acta, 2013 May; 1830(5): 3143 - 3153. 17. Baden et. Al, Biochem. Biophysics, Acta 322, p269-278, 1973 18. PDRN improves angiogenesis and wound healing in experimental thermal injury: bio chemical pharmacology 77(2009) 1117-1124 19. PDRN enhance the proliferation of human skin fibroblasts: involvement of A2 purinergic receptor subtypes: Life Science, Vol. 64, No. 18, pp 1661-1674 199 20. Cell biochemistry and Functon 1999 Life Science 1999 21. Biochim Biophys Acta, 2013 May; 1830(5):3143-53, doi: 10.1016/j.bbagen.2012.09.008. Epub 2012 Sep 17. 35. Journal of the American Academy of Dermatology, 1989, 21(1) 1p~30p 22. Vitamin B12 Deficiency induces imbalance in Melanocytes Homeostasis-A Cellular Basis of Hypocobalaminemia Pigmentary Manifestations. Int J Mol Sci, 2018 Sep 19;19(9), pii: E2845, doi: 10.3390/jms19092845, 23. The Effect of Coenzyme Q10 (Ubiquinone) on Random Pattern Skin Flap Survival in Rat Mode-Annals of Plastic Surgery, SCI 2016;77(2), 28. 9p~ 14p ISSN 0148-7043


معرفی پینک



درمان پیری-پینک



مولتی نیدل ریب اسکین ایکس




0.5 میلی
تا ایدرم فوقانی




19 سوزن
طرح سوزن



32 گیج
سوزن هیپرودرمیک



2 پر
برش لانت



- ✓ طراحی ارگونومیک مشتری پسند
- ✓ رهاسازی آسان و دقیق داروی هدف
- ✓ نفوذپذیری پیشرفته برای پوست به روش بدون درد
- * از شوتر پینک باید در طول برنامه و هنگام قراردادن، به صورت عمودی استفاده شود. مراقب باشید که شوتر پینک نباید از پوست دور شود

مقایسه میزان نفوذ



مولتی نیدل
ریب اسکین ایکس




غلنگ مزوتراپی
0.5 میلی متر



مولتی نیدل
ریب اسکین ایکس



استفاده عادی



استفاده از سری ترنل پین هر دو (0.5 میلی متر و 1.0 میلی متر) به طور قابل توجهی منجر به ضریب نفوذ بهتر eGFP نسبت به استفاده از رولر میکرونیډلینگ می شود. [۱۰۰] با توجه به راحتی بیشتر و کاهش درد ناشی از استفاده از ترنل پین، ممکن است برای مزوتراپی مناسب تر باشد - برای بیماران و متخصصان ایده آل است. * موسسه تحقیقات زیست شناسی و بیوتکنولوژی کره (KRIBB، ۲۰۱۳)، * مطالعه مقایسه ای ترنل پین و درمارولر مزوتراپی

* 0.5 میلی متر در مقایسه با کاربرد نرمال (NC) سطح شدت FL بالاتر (۳۰ برابر) و سرعت نفوذ سریعتر (۲۰ برابر) را نشان می دهد. * انستیتوی تحقیقات زیست شناسی و بیوتکنولوژی کره (KRIBB، ۲۰۱۴)، * In Vivo In Vitro - TURTLEPIN II

سیر درمانی پینک

فاز 1
تحریک

3 جلسه
به فاصله ی
1 تا 2 هفته

فاز 2
محکم و ضخیم کردن

دو جلسه :
با
فاصله ی 1 ماه

فاز 3
حفظ کردن

1 جلسه
هر 3 تا 6 ماه
به طور منظم

طرز کار پینک

YouTube

RIBESKIN



خطوط فک و گردن



ناحیه گیجگاه (شقیقه) - خطوط فرورفتگی گونه
کودی زیر چشم



خطوط پیشانی - خطوط مجرای خروج بینی
شقیقه ها



خطوط لیفت - خطوط رژ لب
خطوط ماریوت (خط افتادگی دهان)

پاکسازی

روش درمانی پینک ایجینک

خنک کننده و تسکین دهنده

هشدار

- از قرار دادن پینک در معرض نور خورشید خودداری کنید. استفاده از کلاه ، ماسک ، پوشش در فضای باز توصیه می شود .
- قبل از شروع چرخه درمان ، از استفاده از تونر یا مقدار زیاد الکل و گرم حاوی BHA ، AHA ، وینامین خودداری کنید .
- 12 ساعت پس از درمان به آرامی آن را با آب تمیز کنید.
- هنگام پاکسازی از وارد آوردن فشار زیاد به پوست خودداری کنید .
- پس از درمان ، از استعمال سیگار ، الکل ، سونا یا ورزش بیش از حد پرهیز کنید. روزانه 201.5 لیتر آب بنوشید .
- برای شرایط بعد از درمان ، استفاده از گرم مرطوب کننده و ضد باکتریایی بازسازی کننده توصیه می شود .
- به مدت 3-5 روز پس از درمان از اعمال فشار زیاد (مالیدن ، خراشیدن) بر روی پوست خودداری کنید .

نتیجه بالینی پینک

منافذ بزرگ پوست تحریک شده

3 درمان / 3 هفته



زنان اواخر دهه 40

سیاهی زیر چشم

4 درمان / 4 هفته



اقایان اوایل 30 سالگی

زنان اوایل 30 سالگی

جوش و پوست ملتهب

5 درمان / 5 هفته



زنان اواخر دهه 40

جوش و منافذ باز

5 درمان / 5 هفته



زنان اوایل 30 سالگی

منافذ بزرگ

5 درمان / 5 هفته



1st week



2nd week



3rd week



4th week



5th week



پینک

درمان ضد پیری پینک

www.ribeskinx.com

www.calamedicalgroup.com

@zibaei __ Calamedical

بسته تک پینک



پینک شوتر
5mL (0.17oz) x4ea



پینک ویال
5mL (0.17oz) x5ea



مولتی نیدل x4ea

Pink Package



مولتی نیدل x4ea



پینک شوتر
5mL (0.17oz) x4ea